

Hygieneplan

gemäß Infektionsschutzgesetz § 18

Maßnahme	Mittel	Zeitpunkt
Hygienische Händedesinfektion nach IfSG	<u>Sterillium virugard</u> nach dem Standard „Hygienische Händedesinfektion“ gem. EN 1500	<ul style="list-style-type: none">• vor und nach therapeutischen Maßnahmen• nach potenzieller Kontamination
Infektionsschutz	FFP3 Maske bei Bedarf Handschuhe Kleiderhygiene	<ul style="list-style-type: none">• während therapeutischer Maßnahmen
Flächendesinfektion: Türklinken Toilette Waschbecken	<u>Melsitt-Lösung 1%</u> (RKI - gelistet) bakterizid und viruzid	<ul style="list-style-type: none">• 2x täglich• nach potenzieller Kontamination
Flächendesinfektion: Behandlungsliege	<u>Melsitt-Lösung 1%</u> (RKI - gelistet) bakterizid und viruzid	<ul style="list-style-type: none">• nach jeder therapeutischen Maßnahme
Wäschewechsel Handtücher	Kochwäsche 95 °C	<ul style="list-style-type: none">• nach jeder potenziellen Kontamination
Flächendesinfektion: Boden Nassraum Möbel	<u>Melsitt-Lösung 1%</u> (RKI - gelistet) bakterizid und viruzid	<ul style="list-style-type: none">• 1x wöchentlich• nach potenzieller Kontamination
Aufbereitung Spenderpumpen	<u>Melsitt-Lösung 1%</u> (RKI - gelistet) bakterizid und viruzid	<ul style="list-style-type: none">• bei jedem Flaschenwechsel